

PROTOCOLE D'ANTALGIE DES DOULEURS DENTAIRES AIGUES (protocoles 5a à 5e)

(La plupart des douleurs dentaires peuvent être évitées par un brossage quotidien et une bonne hygiène buccale)

I - Vérifier l'absence de terrain particulier (notamment une contre-indication connue à l'un des produits à utiliser)

II - Évaluer l'intensité douloureuse par une par une échelle adaptée au patient (EVA, EN, EVS, ECS)

III - Traitement physique

Cryothérapie locale : appliquer un **physiopack froid** (ou une poche de glace) sur la zone douloureuse par séances de 20 minutes, toutes les 2 heures



IV - Traitement médicamenteux selon l'intensité de la douleur, **Si le traitement physique n'est pas efficace en 20 minutes**

Douleur post-soins dentaires (dont extraction) (protocole n° 5a)	Douleurs dentaires aiguës devant être prises en charge, mais nécessitant une consultation stomatologique rapide			
	Pulpite (rage dentaire avec carie connue mais non traitée) (protocole n° 5b)	Douleur des gencives et de la langue (protocole n° 5c)	Douleur de carie non compliquée (provoquée par la mastication, le chaud ou le froid) (protocole n° 5d)	Douleur d'abcès dentaire (avec fièvre et inflammation locale) (protocole n° 5e)
INTENSITÉ FAIBLE (EVA ≤ 3) 1 g de Paracétamol toutes les 6 à 8 heures (Doliprane®, Dafalgan®, Efferalgan®,...) ET Profénid® : 1 gel à 50 mg toutes les 8 heures	INTENSITÉ FAIBLE A MODÉRÉE (EVA ≤ 6) 1 g de Paracétamol-codéine toutes les 6 à 8 heures (Dafalgan-codéine®, Efferalgan-codéiné® ou 2 cps de Codoliprane®,...) ET Profénid® : 1 gel à 50 mg toutes les 8 heures	1 g de Paracétamol-codéine toutes les 6 à 8 heures (Dafalgan-codéine®, Efferalgan-codéiné® ou 2 cps de Codoliprane®,...) ET	1 g de Paracétamol-codéine toutes les 6 à 8 heures (Dafalgan-codéine®, Efferalgan-codéiné® ou 2 cps de Codoliprane®,...) ET	1 g de Paracétamol-codéine toutes les 6 à 8 heures : (Dafalgan-codéine®, Efferalgan-codéiné® ou 2 cps de Codoliprane®,...) ET
INTENSITÉ MODÉRÉE (3 ≤ EVA ≤ 6) 1 g de Paracétamol-codéine toutes les 6 à 8 heures (Dafalgan-codéine®, Efferalgan-codéiné® ou 2 cps de Codoliprane®,...) ET Profénid® : 1 gel à 50 mg toutes les 8 heures	INTENSITÉ SÉVÈRE (EVA ≥ 7) Profénid® : 1 gel à 50 mg toutes les 8 heures ET Appliquer Titration Morphine	Xylocaïne® : 2 à 3 heures avant les repas soit en spray 5% : 5 pulvérisations, 3 fois/j soit en gel buccal 2% : 1 c à c x 3/j	Profénid® : 1 gel à 50 mg toutes les 8 heures	Profénid® : 1 gel à 50 mg toutes les 8 heures
INTENSITÉ SÉVÈRE (EVA ≥ 7) Profénid® : 1 gel à 50 mg/8hres ET Appliquer Titration Morphine				

V – Faire valider l'application du protocole par le médecin dès que possible